

Absceso cerebeloso

El [absceso](#) de [cerebelo](#) es una patología infrecuente pero de lenta evolución. Constituye una urgencia médica.

Epidemiología

Edad promedio de 45.8 años

Clínica

Síntomas más frecuentes, la [cefalea](#) y la [ataxia](#), así como los [vómitos](#), en 83.6%.

El [papiledema](#) y la [diplopía](#) en 3 casos (50%). Solamente 4 pacientes presentaron fiebre y rigidez de nuca: 66.7%. Todos con un puntaje de la Escala de Coma de Glasgow mayor de 8. En todos apareció hidrocefalia obstructiva. Se les realizó drenaje y lavado con antibiótico con sonda intracavitaria. No mortalidad. No reintervención. En infección ótica añadido a síntomas encefálicos, previo o no a meningoencefalitis, hacer un seguimiento en búsqueda de la instalación de un absceso intraparenquimatoso.

Etiología

Su etiología suele ser la infección del oído medio.

Tratamiento

Cirugía de urgencia para evacuar la colección de pus y el lavado con antibiótico ¹⁾.

[q1124](#)

[q3246](#)

[q3361](#)

¹⁾

http://bvs.sld.cu/revistas/mie/vol8_1_09/mie05109.htm

From:

<http://www.neurocirugiacontemporanea.com/> - Neurocirugía Contemporánea ISSN 1988-2661

Permanent link:

http://www.neurocirugiacontemporanea.com/doku.php?id=absceso_cerebeloso

Last update: 2019/09/26 22:24



