

# Clínica de la hemorragia cerebral

La **clínica** va a depender de la **localización**, del **tamaño**, del **edema** acompañante y la presencia de **hidrocefalia** entre otros.

Característicamente se produce una **cefalea**, **vómito** y alteración en el **nivel de conciencia**.

Puede presentarse como **hemiparesia**, disminución de la apertura y desviación de los ojos hacia el lado del cerebro donde se produjo la hemorragia y dificultad para hablar. También puede manifestarse con una alteración para mover los ojos y disminución en la sensibilidad.

Uno de cada 4 pacientes va a presentar un deterioro clínico en las próximas 24 horas sobre todo en alcoholismo, hematoma irregular, nivel de conciencia bajo y niveles bajos de fibrinógeno. Antecedentes de isquemia cerebral, enfermedad hepática, niveles altos de glucosa, y tensión arterial por encima de 200 mm Hg.

Déficit neurológico focal de inicio rápido,

cefalea

náuseas,

vómitos(49%),

disminución precoz del nivel de conciencia (50%)

aumento de la presión arterial (90%)

Comienza habitualmente en vigilia.

Localización	Síntomas Motores	Síntomas sensitivos	Movimientos oculares	Pupilas	Otros
<b>PUTAMEN</b>	Hemiparesia / Hemiplejía contralateral	Pérdida de sensibilidad contralateral	Paresia de la mirada conjugada contralateral raramente ipsilateral	Normales	Hemianopsia homónima, afasia (izquierda). Negligencia o apraxia (derecha)
<b>TÁLAMO</b>	Hemiparesia contralateral	Pérdida de sensibilidad contralateral	Paresia de la mirada conjugada contralateral o ipsilateral, desviación hacia abajo de la mirada, alteración de la mirada hacia arriba, desviación oblicua, nistagmo de convergencia o retracción uni o bilateral, pseudoparálisis VI par	Pequeñas, débilmente reactivas	Afasia (izquierda)
<b>PUENTE</b>	Cuadriparesia, cuadriplejía, debilidad facial bilateral, síndrome de endaustramiento (locked in)		Paresia de la mirada horizontal bilateral, movimientos verticales preservados, bobbing ocular	Puntiformes reactivas	Coma, hipertermia, hiperventilación
<b>CEREBELO</b>	Ataxia troncal de la marcha o de miembros. Debilidad facial ipsilateral	Pérdida de sensibilidad facial ipsilateral. Alteración del reflejo corneal.	Parálisis de la mirada conjugada ipsilateral, parálisis del abductor, desviación oblicua, nistagmo parético	Pequeñas, reactivas	Progresiva, signos sensitivos y motores bilaterales, coma.
<b>FRONTAL</b>	Hemiparesia contralateral		Paresia de la mirada conjugada contralateral	Normales	Afasia (izquierda), abulia
<b>PARIETAL</b>	Hemiparesia contralateral		Pérdida de sensibilidad contralateral	Normales	Hemianopsia homónima contralateral. Afasia (izquierda), apraxia, negligencia (derecha)
<b>TEMPORAL</b>	-			Normales	Hemianopsia homónima contralateral

From:

<http://www.neurocirugiacontemporanea.com/> - Neurocirugía Contemporánea ISSN 1988-2661

Permanent link:

[http://www.neurocirugiacontemporanea.com/doku.php?id=clinica\\_de\\_la\\_hemorragia\\_cerebral](http://www.neurocirugiacontemporanea.com/doku.php?id=clinica_de_la_hemorragia_cerebral)

Last update: **2019/09/26 22:13**

