# Displasia cortical

ver Displasia cortical focal

Las displasias corticales corresponden a un grupo heterogéneo de malformacion del desarrollo cortical (MDC), secundarias a una lesión durante los períodos de proliferación u organización cortical.

Aunque su etiología no se encuentra completamente dilucidada, estas lesiones se caracterizan por la presencia de neuronas y células gliales anormales en una región de la corteza cerebral.

La reoperación es especialmente beneficiosa para niños seleccionados con epilepsia refractaria asociada con displasia cortical que no responden a una resección limitada.

Cuando esté indicado, la reintervención se debe realizar a la edad más temprana posible sacando provecho de la mayor plasticidad funcional compensatoria del déficit neurológico [1)]

1)
Ramantani G, Strobl K, Stathi A, Brandt A, Schubert-Bast S, Wiegand G, Korinthenberg R, Stephani U, van Velthoven V, Zentner J, Schulze-Bonhage A, Bast T. Reoperation for refractory epilepsy in childhood: a second chance for selected patients. Neurosurgery. 2013 Oct;73(4):695-704. doi: 10.1227/NEU.0000000000000081. PubMed PMID: 23842559.

From:
http://www.neurocirugiacontemporanea.com/ - **Neurocirugía Contemporánea**
**ISSN 1988-2661**

Permanent link:
**http://www.neurocirugiacontemporanea.com/doku.php?id=displasia_cortical**

Last update: **2019/09/26 22:24**