

Es extremadamente raro, con sólo 4 casos en la literatura.

Los cuatro casos, han sido pacientes del sexo masculino.

Probablemente hay una predilección por este tipo de lesiones en pacientes menores de 20 años de edad.

Se ve en la TAC como una lesión hiperdensa convexo-cóncava que está detrás del clivus y por delante del tronco cerebral.

La falta de buena resolución de los TAC anteriores pueden ser las razones por las que estas lesiones se han infradiagnosticado.

El mecanismo de formación no está claro

Mientras que Casey y col., sostienen que el daño a las estructuras óseas o ligamentosas en la unión craneovertebral podría ser una causa , Sridhar y col., se debería ruptura de venas puente.

Bibliografía

Sridhar, Krishnamurthy, Prasanna G Venkateswara, Sridhar Ramakrishnaiah, and Vijay Iyer. 2010. "Posttraumatic Retroclival Acute Subdural Hematoma: Report of Two Cases and Review of Literature." *Neurology India* 58 (6) (December): 945–948. doi:10.4103/0028-3886.73756.

From:

<http://www.neurocirugiacontemporanea.com/> - **Neurocirugía Contemporánea** ISSN 1988-2661

Permanent link:

http://www.neurocirugiacontemporanea.com/doku.php?id=hematoma_subdural_retroclival

Last update: **2019/09/26 22:27**

