“La presencia de nodularidad en el meduloblastoma es importante para mejorar la posibilidad de supervivencia, en particular cuando se combina con las bolas y el estroma fino fibrilar”, escribió el Dr. Floyed Giles M.D. del departamento de neuropatología en el Hospital Infantil de Los Ángeles (Los Ángeles, CA, EUA) y colegas en un artículo publicado en la edición de Noviembre 13, 2008, de la revista Pediatric and Developmental Pathology. Dada la sobreposición, reconocida por la OMS del meduloblastoma desmoplásico/nodular y el meduloblastoma nodular, se sugiere que estos diagnósticos se combinen en un diagnóstico de meduloblastoma nodular, con nódulos, bolas y el estroma fino fibrilar como los criterios de definición”.

Los investigadores dicen que tres caracterísiticas histológicas son vitales para los diagnósticos LC y A–los núcleos grandes e intermedios y los nucleolos prominentes–tienen una mala confiabilidad de lectura-relectura y sugieren que se deben combinar en un diagnóstico de meduloblastoma anaplásico/células grandes.

From:
http://www.neurocirugiacontemporanea.com/ - **Neurocirugía Contemporánea ISSN 1988-2661**

Permanent link:
http://www.neurocirugiacontemporanea.com/doku.php?id=meduloblastoma_con_nodularidad_extensa

Last update: **2019/09/26 22:20**