

## Definición

Tipo de meningioma, infiltrante, que puede metastatizar y que expresan mayor actividad proliferativa (mitosis), atipia nuclear, necrosis o crecimiento invasivo.

Son de grado III según la clasificación de la OMS.

## Epidemiología

Constituyen el 1-3% de todos los meningiomas.

## Pronóstico

El pronóstico es malo a pesar de la resección quirúrgica.

Las tasas de recurrencia de meningiomas anaplásicos son un 50-80% y la mediana de supervivencia es de 2 años

La mediana del tiempo hasta la recurrencia es de 9.6-42.1 meses

Tienen características histológicas de malignidad con alto índice mitótico (> 20 mitosis por campo)

Algunos meningiomas anaplásicos son difíciles de identificar debido a la semejanza con sarcomas, carcinomas, o melanomas (Kawahara y col., 2011).

## Bibliografía

Kawahara, Yosuke, Mitsutoshi Nakada, Yutaka Hayashi, Takuya Watanabe, Akira Tamase, Yasuhiko Hayashi, Naoyuki Uchiyama, Hisashi Nitta, y Jun-Ichiro Hamada. 2011. «Anaplastic meningioma with extremely rapid recurrence». Neurologia Medico-Chirurgica 51 (5): 386-388.

From:

<http://www.neurocirugiacontemporanea.com/> - **Neurocirugía Contemporánea ISSN 1988-2661**

Permanent link:

[http://www.neurocirugiacontemporanea.com/doku.php?id=meningioma\\_anaplasico](http://www.neurocirugiacontemporanea.com/doku.php?id=meningioma_anaplasico)

Last update: **2019/09/26 22:25**

