Trombocitopenia

Recuento de plaquetas inferior a 100.000/mm³.

Los valores normales se ubican entre 150.000 y 400.000 plaquetas por cada milímetro cúbico.

Trombocitopenia moderada de 50.000/mm³ a 100.000/mm³.

Menos de 50.000/mm³ es una contraindicación para realizar una biopsia intracraneal.

La profilaxis preoperatoria de la hemorragia en pacientes con trombocitopenia o con trastornos de plaquetas es controvertido.

Los factores de riesgo de hemorragia deben ser evaluados y tratados antes.

El trece por ciento de los pacientes cirróticos tienen un recuento de plaquetas entre 50.000 y / 75.000 microlitros y la trombocitopenia es de origen multifactorial.

No existe un método clínico establecido para predecir el riesgo de hemorragia perioperatoria en los pacientes con trombocitopenia.

Se precisan ensayos clínicos controlados para determinar la seguridad y la utilidad de la profilaxis de la transfusión de plaquetas y los análogos de la trombopoyetina en ciertas situaciones de trombocitopenia refractaria (Benatar-Haserfaty y col., 2011).

Véase Púrpura trombocitopénica idiopática

Bibliografía

Benatar-Haserfaty, J, y R Muñoz de la Vega. 2011. «[Pharmacologic treatment for 2 thrombocytopenic patients prior to neurosurgery]». Revista Española De Anestesiología Y Reanimación 58 (5) (Mayo): 318-321.

From:
http://www.neurocirugiacontemporanea.com/ - **Neurocirugía Contemporánea**
ISSN 1988-2661

Permanent link:
http://www.neurocirugiacontemporanea.com/doku.php?id=trombocitopenia

Last update: **2019/09/26 22:18**