

Trombosis de seno

Se trata de un tipo de [trombosis venosa intracraneal](#).

La [trombosis de seno](#) más frecuentemente trombosados son el [seno lateral](#), el [seno cavernoso](#) y el [seno sagital superior](#).

Los de seno sagital inferior son raros. El primero se describió en 1997.

Seno recto

Seno cavernoso: Puede estar causado por sinusitis esfenoidal.

[Trombosis del seno sagital superior](#)

[Trombosis del seno transverso](#)

[Trombosis del bulbo de la yugular](#)

Tratamiento

La trombectomía combinada con trombolisis es una modalidad de tratamiento segura y válida para casos graves o en pacientes sin una respuesta adecuada a fármaco [antitrombótico](#) ¹⁾

Pronóstico

Aunque la mayoría de los pacientes con trombosis de seno cerebral presentan buenos resultados tras un tratamiento con heparina o warfarina, sigue existiendo un subgrupo de pacientes que no responden al tratamiento de anticoagulación convencional. Estos pacientes, especialmente los más jóvenes, tienen una alta tasa de morbilidad y mortalidad.

¹⁾

Li G, Zeng X, Hussain M, Meng R, Liu Y, Yuan K, Sikharam C, Ding Y, Ling F, Ji X. Safety and validity of mechanical thrombectomy and thrombolysis on severe cerebral venous sinus thrombosis. Neurosurgery. 2013 May;72(5):730-8. doi: 10.1227/NEU.0b013e318285c1d3. PubMed PMID: 23313983.

From:

<http://www.neurocirugiacontemporanea.com/> - **Neurocirugía Contemporánea** ISSN **1988-2661**

Permanent link:

http://www.neurocirugiacontemporanea.com/doku.php?id=trombosis_de_seno

Last update: **2019/11/28 13:21**

